Oxy-Foam® D

Popis

Aktivní pěna pro čištění a dezinfekci struků před a po dojení

Přednosti

Aktivovaná kyselina mléčná v přípravku **Oxy-Foam® D** má silné dezinfekční účinky, které po použití nezanechávají toxické zbytky.

Oxy-Foam® D má dermatologickou složku, která zjemňuje, posiluje a zotavuje pokožku struků. Obsahuje kombinaci 2 zvlhčujících a 2 hydratačních látek s doplňkovými účinky. Dále obsahuje vysoce účinnou tukovou složku, která díky filmu vytvořenému na povrchu pokožky brání odpařování vody. **Oxy-Foam® D** obsahuje provitamin B5, který aktivně působí na obnovování pokožky.

Použití přípravku **Oxy-Foam® D** má následující výhody:

- plná adheze a jednotné pokrytí struků,
- nepřetržité působení,
- nižší spotřeba než u tekutých přípravků.

Vlastnosti

Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma	: bezbarvá pěnicí kapalina
Účinná látka	: kyselina mléčná
Vůně	: květinová
pH čistého výrobku	: 2,7 +/- 0,3
Hustota při 20 °C	: 1,04 +/- 0,02
Citlivost na mráz	: 0 °C
Skladovací teplota	: 0 °C - 30 °C

Legislativa

Biocid: Tento výrobek obsahuje oznámenou účinnou látku podle směrnice 98/8/ES a její modifikace pro výrobky typu 3: veterinární hygiena.

Oznámená účinná látka: kyselina mléčná

Dezinfekce

Baktericidní

Oxy-Foam® D byl testován podle normy EN 1656 (duben 2000). Při tomto testu byly podmínky následující:

Zkušební teplota	:	30 °C
Koncentrace	:	80 a 40 %
Doba kontaktu	:	30 minut
Interferující látka	:	1 % sušeného odstředěného mléka
Kmeny	:	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 *Proteus vulgaris* ATTC 13315 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Enterococcus hirae* ATCC 10541

Výsledky: za podmínek normy EN 1656 (duben 2000) redukuje Oxy-Foam® D všechny testované kmeny o 5 log.

Oxy-Foam® D byl také testován podle normy EN 1656 (duben 2000) za následujících podmínek:

Zkušební teplota	:	10 °C
Koncentrace	:	80 %
Doba kontaktu	:	30 minut
Interferující látka	:	1 % sušeného odstředěného mléka
Kmeny	:	*Proteus vulgaris* ATCC 13315 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Enterococcus hirae* ATCC 10541 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442

Výsledky: za těchto mnohem náročnějších podmínek redukuje Oxy- Foam® D tyto 4 testované kmeny o 5 log.

V jiném testu byl **Oxy- Foam® D** testován podle metodiky normy EN 1656 (duben) na 3 kmenech za následujících podmínek:

Zkušební teplota	:	20 °C
Koncentrace	:	80 %
Doba kontaktu	:	30 sekund
Interferující látka	:	10 % plnotučného tekutého mléka UHT
Kmeny	:	*Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Escherichia coli* ATCC 10536 *Streptococcus uberis* ATCC 19436

Výsledky: za daných podmínek redukuje Oxy-Foam® D tyto 3 testované kmeny o více než 5 log.

Použití

Oblast použití

Příprava struků na dojení ve formě pěny.
Dezinfekce struků před dojením.

Pokyny

Naplňte aplikační nádobku do 2/3 a horizontálně protřepejte.

Několikrát po sobě jemně stiskněte zásobník, až pěna začne z nádobky přetékat.

Naneste pěnu na struky, nechte 30 vteřin působit a poté otřete.

Vybavení

Aplikační nádobka Maxi Foam Ecolab

Toxicita

Oxy-Foam® D není toxický za normálních podmínek použití.

Bezpečnost a opatření

Pokud čisticí přípravek přijde do styku s pokožkou, očima a pod., důkladně vypláchněte vodou a v případě potřeby co nejdříve vyhledejte lékaře.

V případě náhodného požití přípravku důkladně vypláchněte ústa vodou. V případě potíží vypijte neperlivou vodu a vyhledejte lékaře.

Obecně platí, že je třeba vyvarovat se mísení čisticích prostředků, zejména zásady s kyselinou, protože tato směs vede ke vzniku velmi nebezpečné exotermické reakce.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Ecolab snc
8, Rue Rouget-de-Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
www.ecolab.com

ECOLAB®
Divize potravin a nápojů