

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ SLINTAVKY A KULHAVKY

O viru slintavky a kulhavky toho již bylo řečeno mnoho a proto jen velmi krátce. Patří stále k významným virům skupiny Picorna, ačkoliv je v Evropě považován již za vymýcený. Je považován spíše závislý na pH a touto vlastností se liší od ostatních virů této skupiny.

Při pH v rozmezí od 6 do 9 je stabilní, avšak při hodnotách pH pod 4 a nad 13 dochází k jeho inaktivaci již během několika minut. V kejďe přetrvává a byl tam zjištěn ještě po 220 dnech. Virus je velmi odolný proti suchu a na plochách může přežívat několik týdnů i měsíců, v krmivech 15 týdnů a v chlupech hovězího dobytka 4 týdny.

Hlavním zdrojem nákazy jsou samozřejmě nemocná zvířata, případně zvířata u nichž probíhá inkubace. Nakažená zvířata vylučují virus ve slinách již 9 hodin po nakažení. Protože virus se vyskytuje i v krvi, je třeba považovat celé tělo jatečného zvířete za vysoce nakažlivé. Při provádění dezinfekčních opatření nelze samozřejmě, a to obzvláště v zemědělské praxi, vyloučit výskyt velkého množství nečistot. A to především organického původu, což má za následek snížení míry desinfekčního účinku dané látky.

Proto by samotné dezinfekci mělo předcházet důkladné odstranění nečistot. Předností speciálních průmyslově vyráběných chemických prostředků před čistým louhem je vysoký obsah tenzidů, sekvestračních přísad a povrchově aktivních látek.

Opatření, která je třeba provést v provozech pokud hrozí zavlečení této nemoci:

- Doporučuje se zřídit výhradně jeden kombinovaný vchod. Průchod je třeba udržovat neustále uzavřený.
- U vstupu by měli být poznamenána jména a telefonní čísla externích pracovníků, návštěvníků, dodavatelů a odběratelů
- U všech vozidel, vjíždějících do provozu nebo vyjíždějících z něj musí být provedena dezinfekce, zejména kol a spodku.
- Měl by být na minimum omezen přístup cizích osob. Neměly by se uskutečnit návštěvy, které nejsou bezpodmínečně nutné.
- Vyvarujte se „křížové kontaminace“, např. domácími zvířaty.
- Mějte vždy k dispozici vhodné čistící a dezinfekční prostředky a pravidelně doplňujte spotřebované roztoky.
- Při čištění a dezinfekci dbejte, aby byly souvisle pokryty všechny plochy a aby byla dodržena dostatečná doba působení prostředků.
- Dodržujte také pečlivě osobní hygienu - čištění a dezinfekce rukou, holínek, pracovních oděvů atd.
- Doporučujeme zapůjčit návštěvám ochranný oděv. Poté až do chemotermické dezinfekce shromažďujte znečištěné prádlo v utěsněném pytlí.
- U chemických a dezinfekčních prostředků dodržujte stanovené postupy a koncentrace, nezapomínejte na důkladný následný oplach vodou.
- Při provádění dezinfekce dbejte na používání ochranných pomůcek a řiďte se pokyny, které jsou v bezpečnostních listech

Dezinfekce prádla:

- ▲ **Dermaperfekt** - dávkování dle návodu k použití

Dezinfekce rukou:

- ▲ **Skinman Soft Protect** - neředěný, použití dle návodu aplikace

Dezinfekce malých ploch, kabin dopravních prostředků:

- ▲ **Alcodes GF** - dle návodu aplikace

Povrchová dezinfekce:

	PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	VYPUKNUTÍ NÁKAZY
Hypochloran	1% koncentrace	2 % koncentrace
Oxysan ZS	1% koncentrace	2 % koncentrace
Topax 66	3%koncentrace	5 % koncentrace
Incimaxx DES N	1% koncentrace	2 % koncentrace